




DR. ÓSCAR JUNCO
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA



SOBRE DR. ÓSCAR JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA

El Dr. Junco y su equipo presentan una larga trayectoria y experiencia en múltiples casos de cirugía mamaria, cirugía genital, cirugía estética facial y corporal, así como en medicina estética y dieta Pronokal®, trabajando siempre con el objetivo de conseguir unos resultados totalmente naturales.

El Dr. Junco y su equipo ofrecen una atención totalmente personalizada y una relación directa con los pacientes desde la primera visita que es totalmente gratuita y es en la que informarán de las opciones quirúrgicas para resolver cada problema.

Número Teléfono
gratuito general:

900.649.101

www.drjunco.com

GINECOMASTIA POR CONSUMO DE ANABOLIZANTES, UN PROBLEMA CON SOLUCIÓN

La cirugía estética en hombres gana cada vez más adeptos que buscan soluciones para mejorar su imagen

Uno de los casos que se da con más asiduidad es la **ginecomastia (mamas similares a las de la mujer) desarrollada por la ingesta de anabolizantes** en trastornos de vigorexia. Un problema bastante común que afecta a un 40-60 % de los hombres.

La presencia de un aumento mamario en el hombre puede deberse a dos factores: a un aumento del tejido glandular mamario ya bien sea durante la pubertad **o por el consumo de anabolizantes**, o a un aumento del tejido graso en dicha zona.

La cirugía para la corrección de la ginecomastia puede realizarse en hombres sanos, emocionalmente estables y de cualquier edad. El mejor resultado se obtiene cuando la piel es elástica y firme y se adapta al nuevo contorno corporal dando lugar a un tórax plano, firme, y bien contorneado.


Para poder diagnosticar qué tipo de ginecomastia existe es necesario practicar una mamografía, donde se observará el tipo de tejido que se ha desarrollado en exceso.

Según el caso concreto el procedimiento quirúrgico puede hacerse de tres formas distintas:

- Liposucción:** cuando lo que provoca el aumento del volumen mamario es **un exceso de tejido graso**.
- Mastectomía subcutánea:** cuando existe un aumento debido a un **excesivo desarrollo del tejido glandular**.
- Mamoplastia de reducción:** Está indicada cuando existen unas mamas de volumen importante, en las que además de **sobrar tejido glandular, sobra tejido graso y sobre todo piel**.

Las cicatrices son prácticamente inapreciables. La recuperación exige un reposo relativo durante una semana; a partir de los 8 días, el paciente podrá hacer vida normal.

Precio de la intervención: 3.700 euros aprox.



Consulta Badalona:

• DIGEST • Carrer dels Arbres, 53 - 08912 BADALONA

Consulta Barcelona:

• HOSPITAL SANITAS CIMA • Paseo Manuel Girona, 33 (Consultas 208-209) - 08034 BARCELONA

Revista d'Informació de Badalona
Distribució gratuïta
revistabetulo.cat

bétulo

Extra Nadal
gener 2013



**Bon Nadal,
Badalona!**